

ШЕМА ВАКЦИНАЦИЈЕ

Код деце узраста 9–15 година, имунизација се спроводи у 2 дозе (0, 6 месеци).

Код старијих од 15 година, имунизација се спроводи у 3 дозе (0, 2, 6 месеци).

Уколико дође до одлагања у препорученој шеми имунизације, препорука је да се вакцинација комплетира у року од 12–15 месеци. Код таквих случајева започета вакцинација се наставља са недостајућим дозама.

**ИМУНИТЕТ НАКОН ВАКЦИНАЦИЈЕ
ТРАЈЕ НАЈМАЊЕ 10 ГОДИНА.**

НЕЖЕЉЕНЕ РЕАКЦИЈЕ:

- **Локалне:** бола, црвенила и отока, које се спонтано повлаче након пар дана.
- **Опште:** повишна телесна температура, главобоља, вртоглавица, умор, мучнина, а код адолесцената краткотрајни губитак свести (синкопа) са трзајевима.

КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ ЗА ИМУНИЗАЦИЈУ ХПВ ВАКЦИНОМ СУ КАО И ЗА ВЕЋИНУ ВАКЦИНА СЛЕДЕЋЕ:

- акутна болест са тел. температуром изнад 38°C,
- алергија на неку од компоненти вакцине,
- рана преосетљивост на квасац,
- тешка реакција након претходне дате дозе и
- трудноћа.

ХПВ
ВАКЦИНА



ХПВ
ВАКЦИНА

ЗАШТО
СЕ ТРЕБА
ВАКЦИНИСАТИ
ПРОТИВ
ХУМАНОГ
ПАПИЛОМА
ВИРУСА?

Шта је инфекција хуманим папилома вирусима (ХПВ)?

- Једна је од најчешћих полно преносивих инфекција.
- Скоро 80% сексуално активних особа бива инфицирана у неком тренутку током живота.

О хуманом папилома вирусу...

- Откривено је до сада око 200 генотипова ХПВ-а. У односу на врсту промена које изазивају у аногениталној регији, разликују се нискоризични и вискоризични генотипови.

Како се преноси?

- Директним контактом са кожом и слузокожом особе која је заражена вирусом (контакт преко коже, вагинални, анални, орални секс).

Инфекција се може добити у контакту са особом која не мора имати знаке и симптоме инфекције.

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ...

- Код 9 од 10 инфицираних особа, организам се ослободи вируса сопственим имунолошким механизмима унутар 1-2 године без икаквих последица по здравље.
- Дуготрајна инфекција нискоризичним генотиповима ХПВ доводи до настанка гениталних брадавица (кондиломи), папилома на гркљану и промена ћелија грлића материце ниског степена.

МЕЂУТИМ...

У случају дуготрајне инфекције вискоризичним генотиповима ХПВ могућ је развој премалигних и малигних промена и код мушкараца и код жена - ануса, пениса, грлића материце, вулве, вагине, корена језика, крајника, задњег зида ждрела.

КАКО СЕ ЗАШТИТИ ОД ХПВ ИНФЕКЦИЈЕ И ЊЕНИХ ПОСЛЕДИЦА?

ИМУНИЗАЦИЈОМ ПРОТИВ ХПВ ИНФЕКЦИЈЕ.



ХПВ ВАКЦИНА ЕФИКАСНО ШТИТИ ОД:

- инфекција најчешћим генотиповима ХПВ-а одговорних за појаву премалигних промена и рака.

Вакцина такође штити од ХПВ типова 6 и 11 који узрокују већину случајева гениталних брадавица (кондилома).

**БЕЗБЕДНА ЈЕ!
БЕСПЛАТНА ЈЕ ЗА ДЕЦУ УЗРАСТА
9-19 ГОДИНА.**

КО ТРЕБА ДА ПРИМИ ХПВ ВАКЦИНУ?

Деца старија од 9 година

Препорука је да се вакцина прими у 7. разреду основне школе на систематском прегледу када деца иначе примају и вакцину против дифтерије и тетануса. **Жене могу да приме вакцину до 26. а мушкарци до 21. године живота.**

КАДА ЈЕ НАЈБОЉИ ЕФЕКАТ ВАКЦИНЕ?

Уколико се она прими пре ступања у сексуалне односе.

ДА ЛИ ТРЕБА ВАКЦИНИСАТИ И ДЕЧАКЕ?

Да! И мушкарци могу оболети од бенигних и малигних обољења проузрокованих ХПВ, а исто тако преносе инфекцију својим партнеркама.