

У СРБИЈИ...

Рак дебelog црева је други малигни тумор по учесталости оболевања и умирања! Мушкарци оболевају у нешто већем броју у односу на жене.

- Сваке године, региструје се око 4.500 нових случајева, преко 400 само у Београду!
- Само у главном граду са овом болешћу живи укупно преко 5.000 људи.
- Од рака дебelog црева у нашој земљи умре око 3.000 становника сваке године.

КАКО СПРЕЧИТИ НАСТАНАК РАКА?

- У своју свакодневну исхрану уведите што више:
 - поврћа и воћа,
 - намирница богатих влакнima
 - житарица од целог зрна!

Ово ће помоћи редовном пражњењу дебelog црева.

• Трудите се да не конзумирате алкохол!

Ако то ипак чините, потрудите се да то буде повремено и у умереним количинама.

• Немојте пушти!

• Будите физички активни сваки дан!

30 минута дневно пуно значи!

• Одржавајте нормалну телесну тежину!


Уколико сте гојазни, потрудите се да смиршате!

• Упознајте се са породичном историјом оболевања од малигних болести! Важно је да знаете да их је било, посебно ако су се појављивале у раној животној доби чланова уже породице.

И не заборавите...

Циљ редовних тестирања, на сваке две године, код особа старости од 50. до 74. године јесте да се не пропусти тренутак за благовремено откривање почетне промене у дебелом цреву, пре него што се развије малигно оболење.

Јер... када се рак
дебelog црева
открије у
одмаклом
стадијуму,
третман
постаје тежи,
све компликованији
и скупљи,
а шанса за излечење
све су мање...



У Републици Србији је 2012. године започет организовани скрининг програм за рано откривање рака дебelog црева.

Информације о Националном програму скрининга доступне су на <http://www.skriningsrbija.rs>

ПРЕВЕНЦИЈА РАКА ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА

СМАЊИТЕ
РИЗИК
ОТКРИЈТЕ
НА ВРЕМЕ



ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
БЕОГРАД

ШТА ЈЕ РАК ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА?

Рак дебelog црева (колоректални карцином) је злобудни тумор, локализован на завршном делу дигестивног (цревног) тракта. Болест најчешће почиње настанком малих бенигних израштаја на унутрашњем зиду који се зову **аденоматозни полипи**. Управо ови полипи временом се могу изменити и прерассти у малигни тумор.

КО МОЖЕ БИТИ У РИЗИКУ ДА ОБОЛИ?

Од рака дебelog црева може да оболи практично свако, али се он најчешће јавља код људи између 50. и 74. године старости, у оба пола.

Тачан узрок настанка рака није у потпуности познат. Сматра се да настаје као последица удруженог деловања наследних фактора, фактора средине и начина живота.

КОЈИ СУ ФАКТОРИ РИЗИКА?

- исхрана богата црвеним месом и животињским мастима
- пушење
- алкохол
- гојазност
- недостатак физичке активности
- дијабетес
- ранија зрачна терапија у пределу трбуха

НАЈЧЕШЋИ СИМПТОМИ РАКА ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА СУ:

- крварење у стомаци
- промене у пражњењу црева (проливи, затвори, промена својства стомице која траје више недеља, осећај непотпуног пражњења)
- болови у трбуху
- малокрвност
- нагли невољни губитак телесне тежине
- слабост и осећај прекомерног умора

Само постојање ових симптома, обично је знак да је болест већ узнапредовала.

АЛИ... ВАЖНО ЈЕ ДА ЗНАТЕ...

За прелазак премалигне промене у рак понекад треба да прође и неколико година!

То је период у коме често нема никаквих тегоба, а веома је драгоцен!

Благовременим откривањем и уклањањем полипа, пре него што у њима почну да се дешавају малигне промене, може се успешно спречити настанак рака!

РАНО ОТКРИВАЊЕ (СКРИНИНГ) РАКА ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА

Подразумева тестирање здравих особа, без присутних симптома и знакова болести, у циљу отварања промена, најчешће полипа, које претходе настанку рака или отварање рака у раној фази.

Имунохемијски тест за рано отварање скривене крви у стомаци најчешће је коришћена дијагностичка метода. Присуство крви у стомаци често је први знак постојања полипа или рака.

Све особе које имају од 50 до 74 године требало би да ураде овај тест!

КАКО ТУМАЧИТИ РЕЗУЛТАТЕ ТЕСТА?

Позитиван тест још не значи постојање рака!

Особе код којих је тест позитиван упућују се на колоноскопију, како би се поуздано открио узрок крварења. То не мора бити малигна болест, некад је то само добројудни полип или неко друго оболење дебelog црева.

Негативан тест значи поновно тестирање на скривено крварење у стомаци и ради се након две године.

ШТА ЈЕ КОЛОНОСКОПИЈА?

- Преглед дебelog црева, који се ради после добијеног позитивног резултата имунохемијског теста.
- Ову дијагностичку методу, у адекватно опремљеној амбуланти или сали, спроводи за њу обучени лекар специјалиста
- Обавља се инструментом у виду савитљиве цеви са камером, којим се пролази читавом дужином дебelog црева.
- Често представља и терапијско решење, јер се приликом прегледа могу безболно уклонити уочени полипи.
- Углавном је безболна, али се често обавља и у анестезији.
- Ова метода захтева добру припрему пацијента, која најчешће почиње два дана пре заказаног прегледа, а са свим детаљима Вас упознаје Ваш лекар.